

WICHTIGE FAKten

das Produkt

Die erste Oxalsäure-
Einmalanwendung mit Brut
für die konventionelle und
Bio-Imkerei.



Anwendung

Behandlung, wenn die Bienen
im Stock aktiv sind (nicht in
der Wintertraube). Während
der Anwendung dürfen **keine**
Honigräume aufgesetzt sein.
Alle Bienenvölker am selben
Bienenstand gleichzeitig
behandeln.

Behandlung

Langzeitbehandlung über 6 Wochen.
Im Falle einer Reinvaskion kann eine
Folgebehandlung im Abstand von 1
Monat durchgeführt werden.

Packungsgröße

Beutel mit 10 Oxalsäurestreifen für
eine Langzeitbehandlung. Jeder
Streifen enthält 6,44 g Wirkstoff
Oxalsäuredihydrat.

Dosierung

2 Streifen pro
Bienenvolk und
Behandlung.

Wirksamkeit

Temperaturunabhängige Wirkung für
eine verlässliche Sommerbehandlung,
auch bei **hohen Außentemperaturen**.
Nachgewiesene Wirksamkeit **mit und**
ohne Brut.

Wartezeit

0 Tage Wartezeit für Honig.

CALISTRIP® BIOX

Der erste Oxalsäurestreifen.

Entdecken Sie CALISTRIP®
BIOX 6,44 g Oxalsäuredihydrat
pro Streifen – den ersten und
einzigsten in der EU zugelassenen
Oxalsäurestreifen zur effektiven
Bekämpfung der Varroamilbe.
Einfach und zeitsparend in der
Anwendung, stark in der Wirkung:
Die Streifen geben die Oxalsäure
kontinuierlich über den **direkten**
Kontakt mit den Bienen ab und
sorgen so für eine zuverlässige
Langzeitbehandlung über **6**
Wochen – mit oder ohne Brut.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Temperaturunabhängige Wirkung
- 6 Wochen Wirkungsdauer
- Einfache und saubere
Anwendung
- Für konventionelle und
Bio-Imkerei
- Offiziell in der EU zugelassen



Exklusiver Vertrieb durch BeeVital in
Deutschland, Österreich und Tschechien.

BeeVital GmbH, Vienna
verkauf@beevital.com
+43 6219 20645



C CALIER

HANDHABUNG VON CALISTRIP® BIOX

Calistrip® Biox ist dank seines Doppelhakens **längenverstellbar** und eignet sich für **alle gängigen Beutenmaße**.

Für die Anwendung nehmen Sie die Streifen aus dem Beutel und entfernen Sie die einseitige **Schutzfolie**. Wählen Sie die Länge, die am besten zu Ihrem Beutenmaß passt, indem Sie den Streifen bei **Haken A oder B** abknicken.



Position B für Zander oder Langstroth



Position A für Dadant oder Jumbo



Die Streifen sollten immer im Brutraum in die Wabengassen der äußersten Brutwaben platziert werden. Dadurch kommen die Bienen vermehrt in Kontakt mit dem Wirkstoff (Oxalsäuredihydrat) und verbreiten diesen durch ihre Putzaktivitäten.



Dadant

Jumbo

Langstroth



Entfernen Sie die Streifen nach Abschluss der Behandlung und entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Vorschriften.

AT: Calistrip®Biox 6,44 g imprägnierter Streifen für den Bienenstock für Honigbienen. **Wirkstoff:** Oxalsäuredihydrat. **Abgabe:** Rezeptfrei, Abgabe in Apotheken, Drogerien und Imkereifachhandel (gem. § 49 Abs. 12 TAMG).
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Tierarzt oder Apotheker.
DE: Calistrip®Biox 6,44 g imprägnierter Streifen für den Bienenstock für Honigbienen. **Wirkstoff:** Oxalsäuredihydrat. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung der Varroose (*Varroa destructor*) bei Honigbienen (*Apis mellifera*). **Warnhinweise:** Bei der Handhabung des Tierarzneimittels sollte der Anwender eine Schutzausrüstung bestehend aus der üblichen Imkerschutzkleidung und Handschuhen tragen. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. **Wartezeit:** Honig: 0 Tage. **Abgabe:** Frei verkäuflich. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.**



PROTECTING
YOUR BEES